

HAUTTYP TABELLE



Hauttypklassifikation nach Fitzpatrick

Die Einteilung der Hauttypen erfolgt auf Grundlage der international etablierten Fitzpatrick-Klassifikation. Sie dient der Beurteilung der individuellen UV-Empfindlichkeit im Sinne der Anforderungen der EN 16489 (Kund*innenbewertung und Risikominimierung).

Merkmal	Hauttyp I	Hauttyp II	Hauttyp III	Hauttyp IV
Hautfarbe	sehr hell	hell	hell bis hellbraun	hellbraun/olive
Sommersprossen	häufig	häufig möglich	selten	keine
Haare	rötlich, blond	blond bis braun	dunkelblond bis braun	dunkelbraun
Augenfarbe	blau, grau, eher hell	blau, grün, grau, braun, eher hell	grau, braun, gemischt	eher dunkel
Sonnenbrand	immer	meist hohe Sonnenbrandneigung	gelegentlich	selten, kaum Sonnenbrandneigung
Bräunung	keine	gering	langsam, gleichmäßig	schnell, gut
Eigenschutzzeit	keine relevante Eigenschutzzeit (keine Pigmentbildung)	10–20 min	20–30 min	30–45 min
Nutzungsempfehlung	Nutzung unzulässig keine UV-Besonnung empfohlen	Nur eingeschränkt zulässig niedrige Anfangsdosis, langsame Steigerung, erhöhte Vorsicht	Nutzung möglich unter Standardbedingungen kontrollierte Steigerung gemäß Besonnungsplan	Nutzung gut geeignet stabile Bräunungsreaktion, dennoch kontrollierte Dosierung erforderlich

Sundeco Stehsolarium-XL-1,6-Gruppe II

Empfohlene Besonnungszeiten

Erstbesonnung	Erstbesonnung: 100J/m²=0,4 MED	Hauttyp II: 250J/m²=1 MED	Hauttyp III: 350J/m²=1,4MED	Hauttyp IV: 450J/m²=1,8MED
Minuten	2,1	5,3	7,4	9,5

Lesen Sie vor Benutzung des Bräuners die Schutzhinweise!

Vorsicht! UV-Strahlung kann Schäden an Augen und Haut verursachen. Schutzhinweise beachten.